

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei Visite - nach Patientenkontakt - vor Anlegen einer Infusion - vor Injektionen - zwischen Umgang mit verschiedene Patienten - nach Kontakt mit kontaminiertem Material - nach Toilettenbenutzung 	<p>Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen.</p> <p>Die hohle Hand mit Desinfektionsmittel füllen und 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben. Besondere Beachtung ist den Fingerzwischenräumen und den Fingerkuppen zu schenken.</p>	alkoholische Händedesinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, siehe Anhang Nr. 2 dieser Richtlinie , siehe auch Anlage 8	Tierärzte Studierende Praktikanten Tierpfleger
Händedesinfektion	- bei sichtbarer Kontamination	<p>Wurden die Hände sichtbar oder merklich mit keimhaltigem Material (Eiter, Sputum, Stuhl, Exsudat u. ä.) kontaminiert so sind die beschmutzten Stellen mit einen mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch zu reinigen.</p> <p>Anschließend erfolgt eine hygienische Händedesinfektion unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sekunden.</p> <p>Hiernach können die Hände gereinigt werden.</p> <p>Es schließt sich eine weitere hygienische Händedesinfektion an.</p>	alkoholische Händedesinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, siehe Anhang Nr. 2 dieser Richtlinie, siehe auch Anlage 8	Tierärzte Studierende Praktikanten Tierpfleger
Händewaschung	- nach Verschmutzung	Entnahme des Seifenkonzentrates aus dem Wandspender, Hände waschen, gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen.	Waschlotion, siehe auch Anlage 8	Tierärzte Studierende Praktikanten Tierpfleger
Haut- und Handpflege	- mehrmals täglich	Entnahme. aus dem Spender, in die Haut einmassieren. Hautpflegemittel aus einem, von allen Beschäftigten gemeinsam benutzten Behälter, ohne Dosiereinrichtung sind ungeeignet. Geeignet sind z. B. Tuben oder Direktspender.	Pflegeemulsionen	Tierärzte Studierende Praktikanten Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Berufskleidung Schutzkleidung	Je nach Verschmutzung	<p>Die Einrichtung wird ausschließlich in privater Kleidung betreten und verlassen.</p> <p>Die Berufskleidung muss geschlossen getragen werden und die Privatkleidung vollständig bedecken.</p> <p>Die Privatkleidung ist getrennt von der Berufskleidung aufzubewahren.</p> <p>Täglich oder bei Kontamination / Verschmutzung ist die Berufskleidung zu wechseln.</p> <p>Über der Berufskleidung kann eine Schutzkleidung getragen werden.</p> <p>Die Schutzkleidung wird getragen, wenn die Gefahr einer mikrobiellen Kontamination oder der Keimverschleppung besteht. Sie ist immer patientengebunden zu tragen.</p> <p>Nach Arbeitsende und Ablegen der Schutzkleidung erfolgt eine hygienische Händedesinfektion.</p> <p>Nach Dienstende erfolgt nach Ablegen der Berufskleidung und vor Anlegen der Privatkleidung eine hygienische Händedesinfektion.</p>	Chemo-thermisches Wäschedesinfektionsverfahren	Tierärzte Tierpfleger
Schutzkleidung	<ul style="list-style-type: none"> - bei Arbeiten, bei denen mit einer Kontamination zu rechnen ist - bei Bedarf 	Bei bestimmten Arbeiten ist über der Berufskleidung ein Schutzkittel zu tragen, z. B. bei septischen oder immunsupprimierten Patienten.	Schutzkleidung wird nach Gebrauch sterilisiert (siehe Anhang 7)	Tierärzte Studierende Tierpfleger Reinigungspersonal
Einmalschürzen	<ul style="list-style-type: none"> - bei bestimmten Pflegemaßnahmen - bei Schmutzarbeiten 	Anlegen / verbinden, anschließend entsorgen		Tierärzte Studierende Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Röntgenschürzen	- bei Patienten mit Infektionen	Desinfizierend abwischen	Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, (siehe Anhang 2)	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Einmalhandschuhe Schutzhandschuhe	- bei Infektionsgefahr - bei Schmutzarbeiten	<p>Handschuhe sind zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei allen Arbeiten, bei denen ein Kontakt mit Blut, Blutbestandteilen, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen zu erwarten ist, - bei der Durchführung invasiver diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen, bei Berührung der Schleimhaut oder von nässenden oder blutenden Hautveränderungen. <p>Die Einmalhandschuhe sind nach Gebrauch sofort abzuwerfen. Das Tragen von Einmalhandschuhen entbindet nicht von der Pflicht einer hygienischen Händedesinfektion. Einmalhandschuhe dürfen nicht wiederverwendet werden.</p>		Tierärzte Studierende Tierpfleger
Schutzhandschuhe	- bei Reinigungs- bzw. Schmutzarbeiten	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen sind Schutzhandschuhe zu tragen.	Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, (siehe Anhang 2)	Tierpfleger Reinigungspersonal
Mund-/Nasenschutz ggf. Schutzbrille	- bei bestimmten Patienten - bei invasiven Eingriffen	<p>Mund- Nasenschutz und ggf. Schutzbrille sind zutragen, wenn mit einer Aerosolbildung oder Verspritzung von Blut, Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen oder kontaminiertem Material zu rechnen oder bei Patienten, von denen Infektionen ausgehen können oder die vor Infektionen geschützt werden müssen. Der Atemschutz muss über Mund und Nase getragen werden. Er darf nicht vorübergehend heruntergezogen werden. Er muss bei länger dauernden Eingriffen oder bei Durchfeuchtung gewechselt und sofort entsorgt werden.</p> <p>Anschließend sind die Hände zu desinfizieren.</p>		Tierärzte Studierende Tierpfleger Besucher

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Schuhe	- täglich - nach Verschmutzung	Keine Straßenschuhe tragen. Geeignete Berufs- oder Arbeitsschuhe mit folgenden Eigenschaften sind anzuziehen: - vorderer Bereich geschlossen, - Fersenhalt rutschhemmend, - desinfizierbar. Abwischen mit Desinfektionsmittel oder Aufbereitung in der Waschmaschine.	Desinfektionsmittel gemäß DVG-Liste, (siehe Anhang 2)	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Haare		Lange Haare zusammenbinden und evtl. hochstecken		Tierärzte Studierende Tierpfleger Reinigungspersonal
Fingernägel		Die Länge der Fingernägel darf die Fingerkuppen nicht überragen. Nagellack ist nicht zulässig.		Tierärzte Studierende Tierpfleger
Schmuck und Uhren	- vor Arbeitsbeginn	Ablegen Das Tragen von Schmuck / Uhren an den Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet. In Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko dürfen an den Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden (TRBA 250).		Tierärzte Studierende Tierpfleger
Strickjacken		Strickjacken stellen grundsätzlich ein hygienisches Problem dar und dürfen nicht bei Arbeiten am Patienten getragen werden.		Tierärzte Studierende Tierpfleger Reinigungspersonal

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Betreten des Funktionsbereiches durch bereichsfremde Personen	- vor Betreten der Abteilung	Anweisungen des Personals sind zu befolgen		Tierbesitzer Besucher Vet.-Med.-Tech. Personal Sonstige Personen
Hinweise Personal		Die Beschäftigten müssen vor dem Betreten ihres Aufenthaltsraumes, insbesondere ihres Speiseraumes, die getragene Schutzkleidung ablegen. In Arbeitsbereichen mit erhöhter Infektionsgefährdung ist Essen, Trinken und Rauchen nicht erlaubt. Rauchen und Essen ist generell nur in den Aufenthaltsräumen gestattet.		Tierärzte Studierende Tierpfleger Reinigungspersonal
Hautdesinfektion	- vor Blutentnahmen - vor Injektionen	Präparat aufsprühen, Einwirkzeit einhalten 15 Sekunden (Haut trocknen lassen).	Alkoholische Antiseptika	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Schleimhautantiseption	- vor Katheterisierung (Blasenkatheter)	Mit sterilen, satt getränkten Tupfern auftragen. Von der Harnröhre nach außen wischen, Vorgang mehrmals wiederholen (4 – 6 Tupfer), Einwirkzeit (1 Min.) beachten. Sterile Kathetersets, bzw. einzeln verpackte Sterilgüter und geschlossene Harnableitungssysteme verwenden.	Z. B. alkoholische oder Jod-haltige Antiseptika	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Harnableitungssysteme	- bei Bedarf	Entleeren (Einmalhandschuhe tragen), anschließend hygienische Händedesinfektion. Diskonnektion des Systems vermeiden.	Desinfektionsmittel gemäß DVG-Liste, (siehe Anhang 2)	Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Verbandwechsel	Nach Indikation	<p>Das Set-System ist zu bevorzugen Verbandwagen und Arbeitsfläche sind vor und nach dem Verbandwechsel zu desinfizieren. Der Verbandwechsel sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Der Verband sollte unter Zuhilfenahme von Instrumenten gewechselt werden (non-touch-Technik). Es müssen Einmalhandschuhe, falls notwendig sterile Handschuhe getragen werden. Es sind sterile Instrumente zu benutzen. Gebrauchtes Verbandmaterial ist in geeignete Behältnisse zu legen, die verschlossen entsorgt werden. Benutzte Instrumente sind umgehend der Aufbereitung zuzuführen. Nach dem Verbandwechsel muss eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden.</p>	Desinfektionsmittel und Antiseptika Gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Salben	Nach Indikation	<p>Grundsätzlich wird die kleinste Einheit verwendet, wegen möglicher Verkeimungsgefahr. Entnahme nur nach hygienischer Händedesinfektion mittels Spatel oder Dosierspender.</p>	Desinfektionsmittel und Antiseptika Gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Absaugen	- bei Bedarf	<p>Hygienische Händedesinfektion mit alkoholischen Hautdesinfektionsmittel Absaugen unter sterilen Kautelen!! Anschließend wieder hygienische Händedesinfektion! Die Richtlinien des gültigen Pflegestandards müssen eingehalten werden.</p>	Desinfektionsmittel und Antiseptika Gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Maul- und Nasen-Pflege	Bei Indikation	Vorgaben der behandelnden Tierärzte beachten. Hygienische Händedesinfektion, u. U. Einmalhandschuhe tragen.	Antiseptika gemäß VAH-Liste	Studierende Tierpfleger
Infusions-systeme	Bei Anlegen, Wechsel und Entfernung	Hygienische Händedesinfektion. Wechseln unter keimarmen Kautelen. Bei unvermeidbaren Manipulationen am System, vorher mit Hautdesinfektionsmittel einsprühen	Alkoholische Antiseptika gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Arterielle-Systeme	- alle 48 Stunden (2 Tage)	Hygienische Händedesinfektion. Erneuern	Alkoholische Antiseptika gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende Tierpfleger
Injektionen Infusionen Punktionen	Auf Anordnung des behandelnden Tiersrzt	Vor Zubereitung einer Injektion oder Infusion ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. Vor jeder Punktion oder Injektion (s. c, i. m., i. v.) ist eine ordnungsgemäße Hautdesinfektion erforderlich. Einwirkzeit beachten. Vor der Entnahme der Lösung aus der Injektionsflasche Einstichstelle desinfizieren, Einwirkzeit beachten, Desinfektionsmittel trocknen lassen Gebrauchte Kanülen dürfen nicht in die Schutzhüllen zurückgesteckt werden. Die Entsorgung erfolgt ohne jede Zwischenlagerung in ein festes, durchstichsicheres, bruchfestes Behältnis (keine Glasflaschen) Mehrdosierbehältnisse (z. B. Aqua, NaCl etc.) sind max. ein Arbeitstag haltbar	Alkoholische Antiseptika gemäß VAH-Liste	Tierärzte Studierende

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Infusionsflaschen	Bei jeder Infusion	Zubereitung der Infusion unmittelbar vor Gebrauch Infusionsflasche beschriften mit: - Name des Patienten, - Datum und Uhrzeit und - eventuell zugemischte Medikamente. Werden zu Infusionslösungen Medikamente zugemischt, darf dies erst unmittelbar vor Anlegen der Infusion und unter aseptischen Bedingungen erfolgen.	Angabe nicht erforderlich	Tierärzte Studierende
Instrumente Trockenabwurf	- nach Benutzung - nach Kontamination	Benutztes Instrumentarium sofort nach Kontamination bzw. Benutzung in die Instrumentenbehälter - ohne Desinfektionslösung - abwerfen. Den geschlossenen Behälter zur Zentralsterilisation weiterleiten.	Angabe nicht erforderlich	Tierpfleger
Instrumente Manuelle Aufbereitung Nassabwurf	- nach Benutzung - nach Kontamination	Benutztes Instrumentarium mit Handschuhen in Desinfektionslösung einlegen. Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten. In geschlossenem Behälter der Zentralsterilisation zuführen.	Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, Ruprik: Instrumentendesinfektion	Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Gummi- und Kunststoffteile Trockenabwurf	- nach Benutzung - nach Kontamination	Der Zentralsterilisation zuführen	Angabe nicht erforderlich	Tierpfleger
Gummi- und Kunststoffteile Nassabwurf	- nach Benutzung - nach Kontamination	Benutztes Material in Desinfektionslösung einlegen. Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten. In geschlossenem Behälter der Zentralsterilisation zuführen	Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, Ruprik: Instrumentendesinfektion	Tierpfleger
Thermometer	- nach Benutzung	Desinfizierend reinigen. Bei rektaler Messung unbedingt Schutzhülle verwenden.	Alkoholische Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste	Tierpfleger
Stethoskope	- nach Bedarf - nach Kontamination	Wischdesinfektion bzw. Einlegen in Desinfektionslösung	Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste, Ruprik: Instrumentendesinfektion	Tierpfleger
Medizinische Geräte, Monitore etc. Kabel und Elektroden	- nach Gebrauch - täglich	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen! Vorsicht bei Stromführenden Teilen! Netzstecker ziehen!	Alkoholische Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste	Reinigungspersonal
Absauggeräte, einschließlich Schläuche	- nach Benutzung	Nach Gebrauch so entsorgen, dass eine Kontamination der Umgebung ausgeschlossen ist.	Angabe nicht erforderlich	Pflegepersonal
Sekretauffangbehälter Drainagebeutel	- alle 24 Stunden - bei Bedarf	Der Wechsel hat unter keimarmen Bedingungen zu erfolgen. Einmalhandschuhe sind zu tragen. Die Regeln der hygienischen Händehygiene sind zu beachten.	Alkoholische Antiseptika gemäß VAH-Liste	Ärzte Pflegepersonal

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Intubations- besteck	- nach Benutzung	In Einzelteile zerlegen und in der Waschmaschine aufbereiten.		Tierpfleger
Beatmungsgeräte Beatmungs- schläuche Beatmungs- systeme mit Filter	- alle 72 Stunden - bei Patientenwechsel	Atemgasführende Einzelteile zerlegen und in die Waschmaschine geben. Schlauchsysteme erneuern inkl. Kaskade und Schläuche. Das gesamte Gerät ist desinfizierend zu reinigen.	Alkoholische Desinfektionsmittel gemäß VAH-Liste	Tierpfleger

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Versorgungs- container Entsorgungs- container	- bei Bedarf - nach Benutzung	Desinfizierend abwischen	Flächen- /Instrumentendes- infektionsmittel gemäß VAH-Liste	Tierpfleger Reinigungspersonal
Pflegetablets	- nach Benutzung	Desinfizierend abwischen		
Flächeninventar, Licht- und Versorgungs- leisten	- täglich - bei Kontaminationen	Desinfizierend abwischen		
Schränke Außen- und Innenflächen	- wöchentlich - monatlich	Desinfizierend abwischen		
Medikamenten- kühlschrank	- bei Bedarf	Desinfizierend abwischen		
Futtermittel- kühlschrank	- bei Bedarf	Desinfizierend abwischen		
Infusionsständer	- täglich - bei Bedarf	Desinfizierend abwischen		
Visitenwagen, Verbandwagen	- bei Bedarf	Desinfizierend abwischen		
Zu- und Abluftgitter	- alle 2 Monate - bei Verschmutzung	Reinigen		

Hygieneplan

WAS?	WANN?	WIE?	WOMIT?	WER?
Fußböden	- nach Kontamination sofort	aufwischen	Flächendesinfektionsmittel nach VAH-Liste oder DVG-Liste, je nach Verschmutzungsgrad	Reinigungspersonal Tierpfleger
Fußböden	- täglich	aufwischen		Reinigungspersonal
Wände	- bei Bedarf	reinigen		Reinigungspersonal
Abfallbehälter	- täglich - bei Bedarf	Abfallbehälter leeren, reinigen und neue Tüte einlegen.		Reinigungspersonal
Schrankoberfläche	- 1 x monatlich	Feucht reinigen bzw. feucht Staub entfernen		Reinigungspersonal
Unterlagen aus Textilgewebe (z. B. Decken, Tücher)	-täglich -bei Bedarf	Nicht auf den Boden werfen! In geeignete Wäschesäcke abwerfen. Säcke nicht überfüllen und gut verschließen.	Chemothermische Wäschedesinfektion	Tierpfleger
Blut- und Kotkontaminierte Textielunterlagen von infektionsverdächtigen Patienten	Bei Bedarf	Die Wäsche in flüssigkeitsundurchlässige Säcke abwerfen und verschließen. Kontaminationen außen an den Säcken mit Desinfektionslösung entfernen	Sterilisation	Tierpfleger